

КАКО ДА ПОСТАПИТЕ ВО СЛУЧАЈ ДА НАЈДЕТЕ МАМКА?



Доколку најдете мамка која треба да ја отстраните (мамка најдена во двор или на места каде што постои ризик да биде допрена или фатена од деца...):

- земете ја мамката со стапче, ракавица или пластично кесе;
- однесете ја мамката кај ветеринар или во полициска станица или
- однесете ја и оставете ја мамката во помалку населена област и вон дофат на луѓето.

ВО СЛУЧАЈ НА РИЗИЧЕН КОНТАКТ СО ТЕЧНАТА СОДРЖИНА ОД КАПСУЛАТА ВО МАМКАТА, ПОНЕСЕТЕ ЈА МАМКАТА СО СЕБЕ ПРИДРЖУВАЈКИ СЕ ДО Сите МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ И ВЕДНАШ ПОДДЕТЕ КАЈ ВАШИОТ МАТИЧЕН ЛЕКАР

ВАЖНО!

ВАКЦИНИРАЈТЕ ГИ
ВАШИТЕ МИЛЕННИЧИНЬ!
ЗАШТИТУВАЈКИ ГИ НИВ,
СЕ ЗАШТИТУВАТЕ И СЕБЕ СИ.

ИНФОРМИРАЈТЕ ГИ ЛУЃЕТО,
ОСОБЕНО ДЕЦАТА ДЕКА:

- БЕСНИЛОТО Е ФАТАЛНА БОЛЕСТ КАЈ ЖИВОТНИТЕ И ЛУЃЕТО
- МЕСТОТО НА КАСНУВАЊЕ ИЛИ ГРЕБНУВАЊЕ ОД ЖИВОТНО ТРЕБА ВЕДНАШ ДА СЕ ИЗМИЕ СО МНГОУ САПУН И ВОДА
- БЕСНИЛОТО МОЖЕ ДА СЕ СПРЕЧИ СО ВАКЦИНАЦИЈА
- НЕ ТРЕБА ДА СЕ ДОПИРАТ ДИВИ ИЛИ НЕПОЗНАТИ ДОМАШНИ ЖИВОТНИ
- ТРЕБА ДА СЕ ИЗБЕГНУВА КОНТАКТ СО ВАКЦИНАЛНИТЕ МАМКИ
- ВО СЛУЧАЈ НА РИЗИЧЕН КОНТАКТ, ТРЕБА ВЕДНАШ ДА СЕ ПОДДЕ НА ЛЕКАР

АКО СЕ СОМНЕВАТЕ, ЈАВЕТЕ СЕ НА:
0800 32222

Ова публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на AESA Consortium и на никаков начин не ги рефлектира гледиштата на Европската Унија.



ПРЕВЕНЦИЈА ОД БЕСНИЛО КАЈ ЛУЃЕТО!



Градење на капацитетите на
ветеринарите служби за
имплементација на EU Acquis



Финансирано и поддржано од Европската Унија

БЕСНИЛО - ПРЕВЕНЦИЈА КАЈ ЛУЃЕ

БЕСНИЛОТО е смртоносна болест, но со помош на вакцина, болеста и смртта можат да се спречат.

Вирусот ги напаѓа нервните клетки на местото каснато од бесно животно, по што патува до мозокот и предизвикува воспаление и нарушување на мозочните функции. Никој не преживеал воспаление на мозокот предизвикано од беснило, но доколку навремено и соодветно се третираате по ризичниот контакт, појавата на болеста се спречува со 100% сигурност.



ОРАЛНА ВАКЦИНАЦИЈА НА ЛИСИЦИТЕ

Главен носител на болеста во Европа е ЛИСИЦАТА која може да ги зарази сите диви и домашни цицачи, особено мачките и кучинјата.



Во Источна Европа беснилото кај лисиците е широко распространето, додека во Западна Европа беснилото е елиминирано со ОРАЛНА ВАКЦИНА.



Во мај 2011 година започнува ОРАЛНА ВАКЦИНАЦИЈА НА ЛИСИЦИТЕ ПРОТИВ БЕСНИЛО, со фрлање на вакцинални мамки на целата територија на нашата држава од авиони.



Вакциналните мамки се кафени по боја (личнат на чоколадни кокци), направени се од смеса со рибино брашно и имаат мирис на риба, што привлечува лисиците и делува одбивно на луѓето. Во мамките е сместен пластичен контејнер со вакцина во течна состојба која содржи ослабен вирус на беснило.

ШТО ПРЕТСТАВУВА РИЗИЧЕН КОНТАКТ?

Вирусот е во плунката на бесното животно и може да се пренесе на човекот преку:

- Гребење или каснување од куче, мачка, ЛИСИЦА или друго животно
- Лижење на постоечка рана на кожата или слузокожата...

Ризик може да претставува и контакт на течната содржина на мамката со рана на кожата или слузокожата...

АКО МАМКАТА Е ЦЕЛА И НЕОШТЕТЕНА И НЕ ПОСТОИ НИКАКОВ КОНТАКТ СО ТЕЧНОСТА ОД КАПСУЛА ВО МАМКАТА - НЕ ПОСТОИ РИЗИК ОД ИНФЕКЦИЈА.

КАКО МОЖЕ ДА СЕ СПРЕЧИ ИНФЕКЦИЈА СО ВИРУСОТ НА БЕСНИЛО?

Доколку сте имале ризичен контакт, вирусот треба веднаш да се убие или неутрализира пред да ги нападне нервните клетки.

ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПОСТАПКА:

1. Темелно извадете ја раната со многу сапун и вода, најмалку 5 минути.
2. Веднаш поддете кај МАТИЧНИОТ ЛЕКАР, кој ќе процени дали е потребен третман против беснило!

